


สถานการณ์วัณโรค ของประเทศไทย



กรมควบคุมโรค
กองวัณโรค

องค์การอนามัยโลกได้จัดกลุ่มประเทศที่มีการวัณโรคสูง
(High Burden Country Lists) เป็น 3 กลุ่ม



30 ประเทศที่มีปัญหาวัณโรคสูง โดย
20 ประเทศแรกที่มีค่าคาดประมาณ
จำนวนผู้ป่วยสูงสุด และอีก 10 ประเทศ
ที่ค่าอุบัติการณ์สูงสุดโดยไม่อยู่ใน
20 ประเทศแรก

30 ประเทศที่มีปัญหาวัณโรคดื้อยา
หลายขนานสูง โดย 20 ประเทศแรก
ที่มีค่าคาดประมาณจำนวนผู้ป่วย
สูงสุด และอีก 10 ประเทศที่ค่า
อุบัติการณ์สูงสุดโดยไม่อยู่ใน 20
ประเทศแรก

30 ประเทศที่มีปัญหาวัณโรคที่ติด
เชื้อเอชไอวีสูง โดย 20 ประเทศแรก
ที่มีค่าคาดประมาณจำนวนผู้ป่วย
สูงสุด และอีก 10 ประเทศที่ค่า
อุบัติการณ์สูงสุดโดยไม่อยู่ใน
20 ประเทศแรก

ประเทศไทยเป็น 1 ใน 14 (ไม่ใช่ลำดับที่ 14) ที่มีการวัณโรคสูงทั้ง 3 กลุ่ม


จำนวนผู้ป่วยรายใหม่และ
กลับเป็นซ้ำที่ขึ้นทะเบียนรักษา

ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา (DR-TB)

ค่าคาดประมาณจากองค์การอนามัยโลก

85,029 ราย
57,824 ราย IWS ชาย

1,312 ราย
ผลตรวจยืนยัน



อุบัติการณ์วัณโรค 153 ต่อแสน
ประชากร /ผู้ป่วย 106,000 รายต่อปี

27,205 ราย มากกว่า
เพศหญิง 2 เท่า

910 ราย
รักษายาแนวที่ 2 (SLD)



ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา RR/MDR-TB
4,000 ราย

ผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อ HIV

เสียชีวิต



ผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อ HIV
11,000 ราย

6,780 ราย
รายงานเข้าสู่ระบบ



ผู้ป่วยวัณโรคเสียชีวิต 11,000 ราย

5,391 ราย
ได้รับยาต้านไวรัส (ART)

6,098 ราย
ผู้ป่วยวัณโรคเสียชีวิต

ที่มา : Global Tuberculosis Report 2019, WHO