

လူအများတီဘီရောဂါ
အန္တရာယ်ကင်းရေး
အသိမြန်လျှင်
ကုသပျောက်ကင်းမည်
ရောဂါမပျံ့နှံ့ပါ



နိုင်ငံပလတ်ဂျီယာက
ဘီလီရောဂါ

ရဲ့ရီဘီ ရဲကစာဟာယိုမဲပဲကဲကဲ





တီဘီရောဂါ
အသိမြန်လျှင်
ကုသပျောက်ကင်းမည်
ရောဂါမပျံ့နှံ့ပါ
ရောဂါကိုတွေ့ အောင်ရှာ
ကုသပျောက်ကင်းမှုဖြင့် ပြီးမြောက်စေ
တီဘီရောဂါ ဝိုင်းဝန်းကာ
ကာကွယ်တားစီးကြ



၁။ ဝါဒနာ

ခွဲစိတ် ခြစ်ဖောက်မှု မပြုလုပ်
တိုင်ကြားမှု မပြုလုပ်
အားကစား ပျက်စီးမှု
အားကစား ပျက်စီးမှု



တီဘီရောဂါ...ဆိုတာဘာလဲ...ဘယ်လိုကူးစက်နိုင်သလဲ ၁၀၀၀၀...ထိုအခါ... တစ်ခုတည်းအားဖြင့်

တီဘီရောဂါဆိုတာ
ဘက်တီးရီးယားပိုးမှတစ်ဆင့်ဖြစ်ပွားသော
ကူးစက်ရောဂါဖြစ်သည်
ပါးစပ် နှာခေါင်း မပိတ်ပိ ချောင်းဆိုး
နှာချေသောလူနာများမှကူးစက်သည်
ရောဂါဖြစ်သူ၏အနားမှာနေသူသည်
ကူးစက်ရောဂါပိုးများပါသော
လေကိုရှူမိကာ



၁၀၀၀၀ပင်ပင်တစ်ခုတည်း
တစ်ခုတည်းအားဖြင့်
တစ်ခုတည်းအားဖြင့်
တစ်ခုတည်းအားဖြင့်

ထိုပိုးများ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းသို့
ဝင်ရောက်သွားသည် တီဘီရောဂါသည်
ခန္ဓာကိုယ်၏မည်သည့် အပိုင်းတွင်မဆို
ဖြစ်နိုင်သည် သို့သော် အများအားဖြင့်
အဆုတ်တီဘီရောဂါကို အတွေ့
များသည် အဆုတ်



၁၀၀၀၀ပင်ပင်တစ်ခုတည်း
တစ်ခုတည်းအားဖြင့်
တစ်ခုတည်းအားဖြင့်
တစ်ခုတည်းအားဖြင့်

အဆုတ်တီဘီရောဂါရဲ့ အဓိကလက္ခဏာများ အာဇာနည်အသံအကြား



အချိန် ၂ ပတ်ကျော်ကြာ ချောင်းဆက်တိုက် ဆိုးနေခြင်း
 ချောင်းဆိုးရာတွင် ချွဲသလိပ်တွင်သွေးရောပါနေခြင်း
 ချောင်းဆိုးရာတွင် ချွဲသလိပ်တွင်သွေးရောပါနေခြင်း
 ချောင်းဆိုးရာတွင် ချွဲသလိပ်တွင်သွေးရောပါနေခြင်း

တခြားသော လက္ခဏာများလည်းရှိနိုင်သည်။ ဥပမာ -
 ၁ လ အတွင်း ၃ ပတ်ဆက်တိုက် ညဘက်
 အိပ်ပျော်နေချိန်တွင်ပုံမှန်မဟုတ်သော
 ချွေးများထွက်ခြင်း



အာဇာနည်အသံအကြား ချောင်းဆိုးရာတွင် ချွဲသလိပ်တွင်သွေးရောပါနေခြင်း
 ချောင်းဆိုးရာတွင် ချွဲသလိပ်တွင်သွေးရောပါနေခြင်း
 ချောင်းဆိုးရာတွင် ချွဲသလိပ်တွင်သွေးရောပါနေခြင်း



ချောင်းခြောက် သို့မဟုတ်ချွဲသလိပ်ပါသော
 ချောင်းဆိုးခြင်း၊ ရင်ဘတ်နာခြင်း
 ချောင်းဆိုးရာတွင် ချွဲသလိပ်တွင်သွေးရောပါနေခြင်း




အစားအသောက်ပျက်ခြင်း၊
 ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊
 ပိတ်အာဇာနည် အသံအကြား

ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း၊ အဖျားနိန့်ရုံခြင်း၊
 ချောင်းဆိုးရာတွင် ချွဲသလိပ်တွင်သွေးရောပါနေခြင်း

ရောဂါလက္ခဏာရှာဖွေကာ
ရောဂါအမည်သတ်မှတ်ခြင်း...
การวินิจฉัยโรค...



ချွဲကိုစစ်ဆေးကာ
တီဘီကူးစက်ရောဂါပိုးကို
ရှာဖွေခြင်း
ตรวจเสมหะหาเชื้อวัณโรค



အဆုတ်ကို
ခါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း
เอกซเรย์ปอด

ប៉ះកူးចក់ប្រឹះពីវីរោហិត អគ្គរាយន្ត្រីនឹងដោយអប់រំ ក្រុមដែលមានការពិបាកនិងប្រយោជន៍

អគ្គរាយន្ត្រីនឹងដោយ ល្អអប់រំ ប្រជាជនក្រុមដែលមាន

ពីវីរោហិតនឹងដោយល្អនិង
នឹងនឹងកប់កប់ដោយ
(contacts)
អ្នកដែលនៅជាមួយនឹងអ្នកប្រយោជន៍
(contacts)



អ្នកដែលនៅក្នុងគ្រឹះស្ថាន
(prisoners)
អ្នកដែលនៅក្នុងគ្រឹះស្ថាន (prisoners)



អ្នកដែលនៅក្នុងគ្រឹះស្ថាន
អ្នកដែលនៅក្នុងគ្រឹះស្ថាន
(health care workers)
បុគ្គលិកសេវាសុខាភិបាល
(Health care workers)

အောက်ဖော်ပြပါ တခြားရောဂါ
 တွဲဖြစ်နေသောလူနာအုပ်စု
 ဂလုံမညီပွဲတော်အား

အိပ်ချ်အိုင်ဗီ (HIV)

ပိုးကူးစက်နေသူ
 ဖွဲ့စည်းအဖွဲ့အစည်း (HIV)




နာတာရှည်အသက်ရှူလမ်းပိတ်
 ဆို့ရောဂါ (COPD) ရှိသူ
 ဖွဲ့ပွဲအဖွဲ့အစည်း
 ဖွဲ့စည်း (COPD)



ဆီးချိုရောဂါရှိသူ (DM)

ဖွဲ့ပွဲအဖွဲ့အစည်း (DM)



ဆီလီကို့စ် (Silicosis)
ခေါ် ဗုန်မှန်ရှူရှိုက်ခြင်း
ကြောင့်ဖြစ်ရသော

ជွဲပွဲယာ်ရဝ်နုဲနုဲ (Silicosis)



ကျောက်ကပ်ရောဂါရှိသူ
ညွဲပွဲယာ်ရဝ်နုဲ



အစာအိမ်ခွဲစိတ်ထားသူ

အူဖြတ်ဆက်ထားသူ

ညွဲပွဲယာ်နုဲတဲကရဲဖာ
တဲတဲဝဲနံါခဲ



ကိုယ်ခံအားထိန်းသည့်

ဆေးသုံးနေရသူ

ညွဲတဲခဲရဲယာ်ဂရုမိနုဲမဂဲ

တီဘီရောဂါသံသယရှိစေသည့်လက္ခဏာများ

ဦးဆုံးအကူအညီပေးရန်

၂ ပတ်ကျော်ကြာ
ဆက်တိုက်ချောင်းဆိုးခြင်း
ဝါထိတ်တုတ်ဂံဂံ ၂ လီပတ်စ်
ချောင်းဆိုးသောအခါ
ချွဲသလိပ်တွင် သွေးပါနေခြင်း
အိမ်ထဲမှာပင်ပန်းစွာ



အဆုတ်တီဘီရောဂါရှိသူနှင့်
တစ်အိမ်ထဲနေသူ သို့မဟုတ်
နီးနီးနေသူ၏ချွဲသလိပ်တွင်
ပိုးတွေ့ခြင်း၊ အထူးသဖြင့်
ကလေးငယ်များ

အိမ်ထဲမှာပင်ပန်းစွာ
အိမ်ထဲမှာပင်ပန်းစွာ
အိမ်ထဲမှာပင်ပန်းစွာ
အိမ်ထဲမှာပင်ပန်းစွာ

နာတာရှည်ရောဂါရှိသူများ၊ ဥပမာ -
ဆီးချိုသွေးချို၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊
နာတာရှည်အသက်ရှူလမ်းပိတ်ဆို့ရောဂါ
(COPD) စသည်တို့ဖြစ်သည်။

အိမ်ထဲမှာပင်ပန်းစွာ
အိမ်ထဲမှာပင်ပန်းစွာ
အိမ်ထဲမှာပင်ပန်းစွာ
အိမ်ထဲမှာပင်ပန်းစွာ





HIV/အိုးကူးစက်နေသူ/
AIDS ဖြစ်နေသူများ

ជួတိတဗီအေအေ/အိုဘီ/
အိုပီအေအေ



သက်ကြီးရွယ်အိုများ
အိုအိုအို



ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ
แรงงานต่างด้าว



မူးရစ်ဆေးဝါး
ထိုးဆေးခွဲနေသူများ
အိုဘီအေအေ/အိုဘီအေအေ



အကျဉ်းထောင်ထဲတွင်
နေခွဲဖူးသူများ
အိုဘီအေအေ/အိုဘီအေအေ

တီဘီရောဂါသည်...ဆေးကုသပျောက်ကင်းနိုင်ပါသည် ၁၆၆၆၆...ရန်ကင်းရန်ကင်း



ဆေးကုသရာတွင် ထိရောက်၍ အကျိုးသက်ရောက်မှုမြင့်မားသော တီဘီရောဂါကုသဆေးများရှိပါသည်။ မိမိရန်ကင်းရန်ကင်းရှိပါက ပြုစုပေးသော ဆေးကုသမှုများကို အတိုင်းအတာ ဖြစ်အောင် လိုက်နာပါ။

ဆေးကုသရာတွင် အချိန် 6-8 လ ကြာမြင့်မည်။
 ၁၆၆၆၆...ရန်ကင်းရန်ကင်း
 ၁၆၆၆၆...ရန်ကင်းရန်ကင်း



ဆေးကို တစ်လုံးမကျန်ကုန်အောင် သောက်ရမည်။ နေ့စဉ် သတ်မှတ်ထားသည့် အကြိမ်အတိုင်း မပျက်မကွက် ပြည့်အောင် သောက်ရမည်။ သည်းခံသောက်ရမည်။
 ၁၆၆၆၆...ရန်ကင်းရန်ကင်း



မိမိသဘောအလျောက်
ဆေးကို မရပ်ပါနဲ့၊
မှန်တယ်အောင်


ဆေးမတည့်သည့် လက္ခဏာများ
ရှိပါက ဆရာဝန်ထံသို့
အမြန်ဆုံးသွားရောက်တိုင်ပင်ပါ။
ဟာဂ်အာဂါရ။ဖျော
သုတေသနပရိယောဂ်



ဆေးကုသမှု ပြီးမြောက်သည်အထိ
ဆေးကုန်အောင်သောက်ရန်
ကြီးကြပ်စီမံပေးသူ ရှိရမည်။
မိမိအတွက်။လက္ခဏာဂါရ။
အထောက်အကူပြု

တီဘီရောဂါမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ဖို့... ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ခးပိတ်ကံမိုဟ်ပိတ်ပိတ်ပိတ်...ဒါတ်ပိတ်ပိတ်

- ကျန်းမာကြံ့ခိုင်စေရန် ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းများလုပ်ခြင်း၊ အစားအစာအုပ်စု ၅ မျိုး ဖြစ်သည့်အသားငါးအသီးအရွက်စသည်တို့ကိုစုံလင်အောင်စားသုံးပြီး ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်ပါ။
- တီဘီရောဂါရှိသူအနားတွင်နီးနီးကပ်ကပ်နေခြင်းကိုရှောင်ပါ။
- ရိက္ခာအကျိုးစီးပွားပေးခြင်း၊ ဝတ်စားအင်္ကျီအင်္ကျီဝတ်စားခြင်း၊ ဝတ်စားအင်္ကျီအင်္ကျီဝတ်စားခြင်း၊ ဝတ်စားအင်္ကျီအင်္ကျီဝတ်စားခြင်း
- ရိက္ခာအကျိုးစီးပွားပေးခြင်း၊ ဝတ်စားအင်္ကျီအင်္ကျီဝတ်စားခြင်း၊ ဝတ်စားအင်္ကျီအင်္ကျီဝတ်စားခြင်း
- တီဘီရောဂါရှိသူအနားတွင်နီးနီးကပ်ကပ်နေခြင်းကိုရှောင်ပါ။



- အကယ်၍ တီဘီရောဂါရှိသူ အိမ်တွင်ရှိနေပါက နေ့စဉ်ဆေးကို အပျက်မကွက် ကုန်အောင်တိုက်သင့်သည်။
- အဆုတ်ကိုခါတ်မှန်ရိုက်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်ချွဲသလိပ်စစ်ဆေးခြင်းကို ချက်ချင်းလုပ်ဆောင်မှု၊ ရရှိစေရန် အနည်းဆုံး တစ်နှစ် တစ်ခါ အဆုတ်ကို ခါတ်မှန်ရိုက်ကာ ခန္ဓာကိုယ်စစ်ဆေးမှု ခံယူသင့်သည်။
- ถ้ามีผู้ป่วยวัณโรคอยู่ในบ้าน ควรให้กินยาครบถ้วนสม่ำเสมอทุกวัน
- ควรตรวจร่างกาย โดยการเอกซเรย์ปอดอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อรับการตรวจโดยการเอกซเรย์ปอด และตรวจเสมหะทันที



လူအများတီဘီရောဂါအန္တရာယ်ကင်းစေရန်
 เพื่อสังคมปลอดภัยจากวัณโรค

 အသိမြန်လျှင်...
 ခွံ့ရီ...

ပုံမှန်မဟုတ်သောလက္ခဏာများပြပါက ရောဂါဖြစ်ဖွယ်ရှိသောသံသယ ဖြစ်ကာ အိမ်နှင့်နီးသော ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသောနေရာသို့မဟုတ်ဆေးရုံသို့ အမြန်ဆုံးသွား၍ ဆရာဝန်နှင့် တွေ့သင့်သည်။

ဓာတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ရန်အတွက်
 ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ဝင်များနှင့်
 ဝန်ဆောင်မှုပေးသောနေရာသို့
 အမြန်ဆုံးသွား၍ ဆရာဝန်နှင့်
 တွေ့သင့်သည်။



 ကုသပျောက်ကင်းမည်...
 ရိက္ခာစား.....

ဆေးကုသရာတွင် ထိရောက်၍ အကျိုး သက်ရောက်မှု မြင့်မားသော တီဘီရောဂါကုသဆေးများရှိပါသည်။ ဆေးကုသရာတွင်အချိန် 6-8 လ အတွင်းပျောက်ကင်းစေနိုင်သည်။ ဆေးကိုတစ်လုံးမကျန်ကုန်အောင်သောက်ရမည်။ နေ့စဉ်သတ်မှတ်ထားသည့် အကြိမ်အတိုင်း ပြည့်အောင် သောက်ရမည်။

မိမိရိက္ခာစားရန်အတွက် ပြုလုပ်ရန်အတွက်
 ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ဝင်များနှင့်
 ဝန်ဆောင်မှုပေးသောနေရာသို့
 အမြန်ဆုံးသွား၍ ဆရာဝန်နှင့်
 တွေ့သင့်သည်။

✓ ရောဂါမပျံ့နှံ့ပါ...
မိမိမပြန့်ပွား...

ချောင်းဆိုးပါက..
တခြားသူများဆီသို့ ပိုးများပျံ့နှံ့မသွားစေရန်
ကာကွယ်ရန်အတွက် နှာခေါင်းနှင့်ပါးစပ်ကို
ဖုံးအုပ်သည့် အကာကိုဝတ်ထားပါ။



မိမိအားကာကွယ်ပေးရန်..
ပိတ်ဆို့ထားသည့် အကာကိုဝတ်ထားပါ။
ပိတ်ဆို့ထားသည့် အကာကိုဝတ်ထားပါ။

မိမိအားကာကွယ်ပေးရန်..
ပိတ်ဆို့ထားသည့် အကာကိုဝတ်ထားပါ။
ပိတ်ဆို့ထားသည့် အကာကိုဝတ်ထားပါ။







ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသူ

တီဘီရောဂါဆိုင်ရာရုံး၊ ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးဌာန၊
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသောနှစ် 2560

ပုံနှိပ်သည့်နေရာ

စာစီဂရပ်ဖစ်နှင့်ဒီဇိုင်းပုံနှိပ်တိုက် ဘန်ကောက်မြို့

ဘာသာပြန်မှု စီမံပြင်ဆင်သူ

ဘာသာပြန်ခြင်းနှင့်ဘာသာစကားဝန်ဆောင်မှုစင်တာ
အာရှဘာသာစကားနှင့်ယဉ်ကျေးမှုသုတေသနပြုဌာန၊
မဟိဒွန်တက္ကသိုလ်



จัดพิมพ์โดย

สำนักกวีนิพนธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ปีที่พิมพ์

2560

พิมพ์ที่

สำนักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์ กรุงเทพฯ

แปลเอกสารที่

ศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

